



EUTHABAG®

PROTOCOLES DE SÉDATION PRÉEUTHANASIE
POUR PATIENTS CANINS ET FÉLINS





SOMMAIRE : PROTOCOLES DE SÉDATION PRÉEUTHANASIE POUR CHIENS

PATIENT DOCILE

	ACÉPROMAZINE 10 mg/ml	BUTORPHANOL 10 mg/ml	KÉTAMINE 100 mg/ml	XYLAZINE 100 mg/ml	DEXMÉDÉTOMIDINE	Optionnel MIDAZOLAM 5 mg/ml
BODODO	0,22 mg/kg	0,1 mg/kg	2,22 mg/kg	1 mg/kg	x	x
DOGGIE MAGIC	x	0,2-0,5 mg/kg	2-10 mg/kg	x	375 mcg/m ²	x
ABK	0,3 mg/kg	0,3 mg/kg	10 mg/kg	x	x	0,2 mg/kg

PATIENT RÉACTIF

Sédation ORALE avant le rendez-vous		+	Sédation ORALE à la clinique	
TRAZODONE	GABAPENTINE		DEXMÉDÉTOMIDINE ou DÉTOMIDINE	PENTOBARBITAL OU
7-10 mg/kg	10-40 mg/kg		50-150 mcg/kg	60 mg/kg



SOMMAIRE : PROTOCOLES DE SÉDATION PRÉEUTHANASIE POUR CHATS

PATIENT DOCILE

	KITTY MAGIC	ACÉPROMAZINE 10 mg/ml	KÉTAMINE 100 mg/ml	Optionnel		
				+/- MIDAZOLAM 5 mg/ml	+/- HYDROMORPHONE 2 mg/ml	+/- ALFAXALONE 10 mg/ml
A	x	0,2 mg/kg	10 mg/kg	0,2 mg/kg	0,01 ml/ chat	2 mg/kg
B	0,3 ml/5 kg	x	x	x	x	x

PATIENT RÉACTIF

Sédation ORALE avant le rendez-vous			Optionnel	
Sédation ORALE avant le rendez-vous			Sédation ORALE à la clinique	
TRAZODONE	GABAPENTINE	BUPRÉNORPHINE	+/- DEXMÉDÉTOMIDINE	+/- KÉTAMINE
50-100 mg/ chat	50-100 mg/ chat	0,1 mg/ chat	50 mcg/kg	5-10 mg/kg



COMPARAISON : PROTOCOLES DE SÉDATION PRÉEUTHANASIE POUR CHIENS

Ingrédients	BODODO	DOGGIE MAGIC	ABK
Acépromazine	●		●
Butorphanol	●	●	●
Dexmédétomidine		●	
Kétamine	●	●	●
Xylazine	●		
Avantages			
Économique	●		●
Peut-être administré par voie sous-cutanée	●		
Sédation profonde	●	●	
Efficace chez les animaux réactifs	●	●	●
Petit volume à injecter	●	●	
Désavantages			
Réactions aux bruits		●	
Efficacité altérée par les catécholamines		●	
Coûteux		●	
Diminution de la pression sanguine		●	



DOSAGES DE SÉDATION PRÉEUTHANASIE ORALE POUR CHIENS RÉACTIFS

Sédation ORALE avant le rendez-vous

Trazodone 7-10 mg/kg + Gabapentine 10-40 mg/kg

Administer PAR VOIE ORALE 3 fois : la veille + le matin + 2 heures avant le rendez-vous

Sédation ORALE à la clinique

	Gel de DÉTOMIDINE* 7600 mcg/ml		OU	DEXMÉDÉTOMIDINE injectable 500 mcg/ml		OU	PENTOBARBITAL 240 mg/ml
	Sans goût					Amer	
	SUR du beurre d'arachide/fromage à la crème					Mélangé à la nourriture	
Poids	100 mcg/kg	150 mcg/kg		50 mcg/kg	75 mcg/kg		60 mg/kg
KG	ML	ML		ML	ML		ML
2	0,03	0,04		0,20	0,30		0,50
3	0,04	0,06		0,30	0,45		0,75
4	0,05	0,08		0,40	0,60		1,00
5	0,07	0,10		0,50	0,75		1,25
6	0,08	0,12		0,60	0,90		1,50
7	0,09	0,14		0,70	1,05		1,75
8	0,11	0,16		0,80	1,20		2,00
9	0,12	0,18		0,90	1,35		2,25
10	0,13	0,20		1,00	1,50		2,50
11	0,14	0,22		1,10	1,65		2,75
12	0,16	0,24		1,20	1,80		3,00
13	0,17	0,26		1,30	1,95		3,25
14	0,18	0,28		1,40	2,10		3,50
15	0,20	0,30		1,50	2,25		3,75
16	0,21	0,32		1,60	2,40		4,00
17	0,22	0,34		1,70	2,55		4,25
18	0,24	0,36		1,80	2,70		4,50
19	0,25	0,38		1,90	2,85		4,75
20	0,26	0,39		2,00	3,00		5,00
22	0,29	0,43		2,20	3,30		5,50
24	0,32	0,47		2,40	3,60		6,00
26	0,34	0,51		2,60	3,90		6,50
28	0,37	0,55		2,80	4,20		7,00
30	0,39	0,59		3,00	4,50		7,50
32	0,42	0,63		3,20	4,80		8,00
34	0,45	0,67		3,40	5,10		8,50
36	0,47	0,71		3,60	5,40		9,00
38	0,50	0,75		3,80	5,70		9,50
40	0,53	0,79		4,00	6,00		10,00

* Usage hors homologation. Porter des gants pour manipuler le produit.



DOSAGES DE SÉDATION PRÉEUTHANASIE POUR CHATS

PATIENT DOCILE (VOIE INTRAMUSCULAIRE)

Poids	ACÉPROMAZINE 10 mg/ml Dose : 0,2 mg/kg	+ KÉTAMINE 100 mg/ml Dose : 10 mg/kg	Optionnel		
			+/- MIDAZOLAM 5 mg/ml Dose : 0,2 mg/kg	+/- HYDROMORPHONE 2 mg/ml Dose : 0,005 mg/kg	+/- ALFAXALONE 10 mg/ml Dose : 2 mg/kg
KG	ML	ML	ML	ML	ML
1	0,02	0,10			0,20
2	0,04	0,20			0,40
3	0,06	0,30	0,01	0,01	0,60
4	0,08	0,40	0,15	0,01	0,80
5	0,1	0,50	0,2	0,01	1,00
6	0,12	0,60	0,25	0,01	1,20
7	0,14	0,70	0,25	0,01	1,40
8	0,16	0,80	0,3	0,01	1,60

Remarque : Après avoir prélevé le médicament, ajouter 0,1 cc de lidocaïne pour que l'injection soit indolore.

PATIENT RÉACTIF

Sédation orale avant le rendez-vous*

TRAZODONE	GABAPENTINE	BUPRÉNORPHINE
50-100 mg/chat	50-100 mg/chat	0,1 mg/chat

* Administrer la veille, puis le matin et 2 heures avant le rendez-vous.

Sédation orale à la clinique

Poids	Sans goût	Optionnel - Goût amer	
	DEXMÉDÉTOMIDINE 500 mcg/ml Dose : 50 mcg/kg	+ / KÉTAMINE** 100 mg/ml Dose : 5 mg/kg	+ / - KÉTAMINE** 100 mg/ml Dose : 10 mg/kg
KG	ML	ML	ML
2	0,20	0,10	0,20
3	0,30	0,15	0,30
4	0,40	0,20	0,40
5	0,50	0,25	0,50
6	0,60	0,30	0,60
7	0,70	0,35	0,70
8	0,80	0,40	0,80
9	0,90	0,45	0,90

** Ajouter 0,1 mL de sirop d'érable à la kétamine pour réduire le goût.



DOSES DE PENTOBARBITAL POUR L'EUTHANASIE

Dose : 108 mg/kg ou 1 ml/2,5 kg IV

Poids	PENTOBARBITAL 240 mg/ml
KG	ML
2	1
3 à 5	2
6 à 7	3
8 à 10	4
11 à 12	5
12 à 14	6
14 à 16	7
16 à 18	8
18 à 20	9
20 à 22	10
22 à 24	11
24 à 27	12
28 à 29	13
29 à 33	14
33 à 35	15
35 à 37	16
37 à 39	17
39 à 41	18
41 à 43	19
44 à 47	20
47 à 49	21
49 à 51	22
51 à 52	23
52 à 53	24
53 à 55	25

Par mesure de précaution, il est recommandé d'apporter le flacon de Pentobarbital ou, du moins, une dose supplémentaire.



DOSAGES DE SÉDATION PRÉEUTHANASIE POUR CHIENS

Premier choix : **BODODO**

Économique, sédation et analgésie profondes
Administration sous-cutanée ou intramusculaire


Mary Gardner, D.M.V.,
cofondatrice de
Lap of Love Veterinary Hospice,
2019

PRÉMÉLANGE

Ingrédients	Concentration	ML
Acépromazine	10 mg/ml	10
Kétamine	100 mg/ml	10
Xylazine	100 mg/ml	5
Butorphanol	10 mg/ml	5

DOSE DE PRÉMÉLANGE

Poids	Prémélange BODODO
KG	ML
2	0,1
3	0,2
4	0,3
5	0,35
6	0,4
7	0,5
8	0,55
9	0,6
10 à 13	0,9
13 à 15	1
15 à 20	1,4
20 à 25	1,5
25 à 30	2
30 à 33	2,2
33 à 37	2,5
37 à 45	3
45 à 50	3,3
50 à 55	3,7
55 à 60	4



Dose : 0,3 ml/4,5 kg



DOSAGES DE SÉDATION PRÉEUTHANASIE POUR CHIENS

Deuxième choix : **DOGGIE MAGIC**

Sédation et analgésie profondes

Administration intramusculaire

Poids	DEXMÉDÉTOMIDINE 0,5 mg/ml Dose : 375 mcg/m ² IM	+	BUTORPHANOL 10 mg/ml	+	KÉTAMINE 100 mg/ml
KG	ML		ML		ML
2	0,12		0,12		0,12
3	0,15		0,15		0,15
4	0,20		0,20		0,20
5	0,30		0,30		0,30
6	0,30		0,30		0,30
7	0,30		0,30		0,30
8	0,35		0,35		0,35
9	0,40		0,40		0,40
10 à 13	0,40		0,40		0,40
13 à 15	0,45		0,45		0,45
15 à 20	0,50		0,50		0,50
20 à 25	0,60		0,60		0,60
25 à 30	0,70		0,70		0,70
30 à 33	0,75		0,75		0,75
33 à 37	0,80		0,80		0,80
37 à 45	0,90		0,90		0,90
45 à 50	1,00		1,00		1,00
50 à 55	1,00		1,00		1,00
55 à 60	1,10		1,10		1,10





DOSAGES DE SÉDATION PRÉEUTHANASIE POUR CHIENS

Troisième choix : **ABK**

Sédation modérée, pression sanguine stable

Administration intramusculaire

Poids	ACÉPROMAZINE 10 mg/ml Dose : 0,2 mg/kg	+	BUTORPHANOL 10 mg/ml Dose : 0,3 mg/kg	+	KÉTAMINE 100 mg/ml Dose : 10 mg/kg	Optionnel	
						+/- GLYCOPYRROLATE 0,2 mg/ml Dose : 0,01 mg/kg	+/- MIDAZOLAM 5 mg/ml Dose : 0,2 mg/kg
KG	ML		ML		ML	ML	
2	0,04		0,06		0,20	0,10	0,08
3	0,06		0,09		0,30	0,15	0,12
4	0,08		0,12		0,40	0,20	0,16
5	0,10		0,15		0,50	0,25	0,20
6	0,12		0,18		0,60	0,30	0,24
7	0,14		0,21		0,70	0,35	0,28
8	0,16		0,24		0,80	0,40	0,32
9	0,18		0,27		0,90	0,45	0,36
10	0,20		0,30		1,00	0,50	0,40
11	0,22		0,33		1,10	0,55	0,44
12	0,24		0,36		1,20	0,60	0,48
13	0,26		0,39		1,30	0,65	0,52
14	0,28		0,42		1,40	0,70	0,56
15	0,30		0,45		1,50	0,75	0,60
16	0,32		0,48		1,60	0,80	0,64
17	0,34		0,51		1,70	0,85	0,68
18	0,36		0,54		1,80	0,90	0,72
19	0,38		0,57		1,90	0,95	0,76
20	0,40		0,60		2,00	1,00	0,80
22	0,40		0,66		2,20	1,10	0,88
24	0,40		0,72		2,40	1,20	0,96
26	0,40		0,78		2,60	1,30	1,04
28	0,40		0,84		2,80	1,40	1,12
30	0,40		0,90		3,00	1,50	1,20
32	0,40		0,96		3,20	1,60	1,28
34	0,40		1,02		3,40	1,70	1,36
36	0,40		1,08		3,60	1,80	1,44
38	0,40		1,14		3,80	1,90	1,52
40	0,40		1,20		4,00	2,00	1,60

